


Somontano de Barbastro



- Zona de transición entre región biogeográfica alpina y mediterránea
- Sierras prepirenaicas
- Masas boscosas aclaradas entremezcladas con matorral, pastos y cultivos tradicionale
- Arterias fluviales
- Cultivos de secano entre ambiente estepario premonegrino
- Formaciones gipsícolas
- Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara

1 La comarca de Somontano de Barbastro: La diversidad y los contrastes, una seña de identidad

La comarca de Somontano de Barbastro es un territorio de transición entre las sierras exteriores de los Pirineos y las llanuras esteparias del valle del Ebro, que en una superficie de 1.167 Km² alberga gran diversidad de hábitat, ecosistemas y paisajes.

La variedad, los matices y los contrastes de su paisaje, así como la abundancia de elementos culturales, son una parte importante de su belleza y atractivo.

Los valores ornitológicos de este territorio son extraordinarios:

El norte del Somontano está coronado por la Sierra de Guara, un ambiente rupícola de carácter mediterráneo con matices alpinos en las máximas altitudes. Aquí habita una de las comunidades de aves rapaces más completas y densas, en la que destacan el **quebrantahuesos**, el **buitre leonado**, el **alimoche** y el **águila real**.

En el área central el hombre ha generado a lo largo de los siglos un extraordinario paisaje mosaico agroforestal, con áreas extensas de matorral, bosques de encina aclarados, y campos de cultivo (cereales, olivos, almendros y vid). En las márgenes de estos campos, la vegetación natural mantiene conectadas las masas forestales, y es refugio y zona de cría para las distintas aves (**águila culebrera**, **aguililla calzada**, **escribanos**, **curruacas** y **fringílidos**, etc.).

La diversidad se completa en el Sur, con paisajes semiáridos donde todavía dominan los cultivos de secano, entre muelas terrosas y vegetación natural, lo que ha favorecido la permanencia de aves esteparias de importante interés ornitológico como **ganga ibérica**, **ganga ortega**, **sisón** y **alcaraván**.



Aves de los principales ambientes

2

SIERRAS PREPIRENAICAS. MEDIO RUPÍCOLA

Las sierras de la zona Norte de la Comarca de Somontano se caracterizan por un quebrado paisaje de cañones, poco alterado por el hombre, de gran belleza. Los procesos erosivos de karstificación y meteorización de la roca han originado morfologías singulares en las paredes de los barrancos, generando multitud de abrigos, resaltes, fisuras y oquedades, que son ocupados por una extraordinaria comunidad de seres vivos entre los que destacan las aves.

El **quebrantahuesos**, prácticamente desaparecido en la Península Ibérica y en buena parte del mundo, mantiene en esta zona una de las poblaciones más viables de Europa.

Además, **buitres**, **alimoches**, **águilas reales**, **halcones peregrinos** y **cernícalos** comunes anidan en abrigos y repisas calcáreas de los cañones. El **águila perdicera**, aunque no anida en este territorio desde 1997, es cada vez más frecuente.


Otras aves que ocupan las fisuras y oquedades del roquedo son: **vencejo real**, **avión roquero**, **avión común**, **chova piquirroja**, **gorrión chillón**, **roquero rojo** y **roquero solitario**. Es relevante la presencia de la **collalba negra**, por ser una especie de distribución muy reducida, cuyo límite Norte se sitúa en el Somontano

y el límite Sur en el extremo septentrional de África.


También destaca la presencia del **treparriscos** y el **acentor alpino**, aves de rango alpino que frecuentan los roquedos del Somontano durante los meses más fríos, y pueden ser observadas con facilidad en el entorno de los pueblos serranos.



Roquedos del río Vero.



Quebrantahuesos.



Collalba negra.

MEDIO FORESTAL Y AGROFORESTAL

Al Norte de la comarca, en las zonas de mayor altitud, donde se desarrollan los bosques mixtos de quejigos, pino silvestre y encina, de carácter húmedo, encontramos especies típicas del bosque pirenaico como el azor, el gavi-lán, el trepador azul, el cama-chuelo, el herrerillo capuchino, y en algunos momentos del invierno, el verderón serrano.


En la zona media del Somontano, el bosque climácico era el carrascal, pero la presencia humana ha originado un paisaje mosaico, de cultivos herbáceos y arbóreos intercalados con vegetación natural de matorral y bosques aclarados, que albergan alta diversidad de

especies muy interesantes para ornitólogos y naturalistas. Aves propias de este ambiente son el águila culebrera, aguililla calzada, alcotán, busardo ratonero, mosquitero papialbo, curruca carrasqueña, mirlona cabecinegra y rabilarga, reyezuelo listado, escribano soteño y hortelano, alcaudón común, pinzón común, abejaruco, picogordo, torcecuello, etc.

En la comarca de Somontano también es frecuente encontrar extensos pinares de repoblación. Aunque estos hábitat son pobres en biodiversidad, a ellos se han sabido adaptar aves como el búho chico, el criálo y el zorzal charlo.



Observadores en el bosque.



Abejaruco.



Paisaje agroforestal.

RÍOS Y HUMEDALES

Los sotos fluviales del Somontano alejados de las zonas más humanizadas, presentan un buen estado de conservación. En las riberas de los ríos Alcanadre, Isuala y Vero se conservan comunidades vegetales de chopos, álamos y sauces donde anidan aves propias de los sotos, como la **oropéndola**, el **pito real**, el **agateador común**, y pájaros pequeños como **ruiseñores**, **curruacas**, **reyezuelos**, **carboneros**, **herrerillos** y **mitos**, **mosquiteros**, **carriceros**, **papamoscas gris**, durante los pasos migratorios se observa el **papamoscas cerrojillo**. También pueden encontrarse aves rapaces como el **milano negro**. En los taludes de los ríos anidan el **martín pescador** y el **abejaruco**. En los cursos altos se encuentran la lavandera **cascadeña** y el singular **mirlo acuático**, fácil de observar cerca de la localidad de Alquézar.

En el río Cinca, aguas abajo del embalse de El Grado, el escaso desnivel y la regulación de la presa han originado la formación de multitud de canales y remansos con diferentes grados de colonización vegetal: bosques galería y sotos de álamos, chopos, sauces... Estos espacios son zona de cría, refugio y alimento de aves como el **aguilucho lagunero**, **somormujo**, **lavanco**, **cigüeñuela**, **chorlitejo chico**, y las **ardeidas** o **garzas**. De este último grupo es posible observar aquí todas las de la Península: la **garza real**, **garza imperial**, **garceta común**, **martinete**, **garcilla bueyera**, la cada vez más presente **garceta grande**, y muy

escasas, aunque suelen verse todos los años, la **garcilla cangrejera**, el **avetorillo** y el **avetoro**. Además es muy particular la presencia de **pájaro moscón** y **martín pescador**.

El río Cinca destaca además por ser ruta migratoria para las aves,

entre las que destacan la **cigüeña negra** y el **águila pescadora**, además de diferentes especies de **ánades** y **limícolas**. Al final del invierno miles de **grullas** vocingleras siguen el trazado de este río en su viaje de retorno al norte de Europa.



Pájaro moscón.



Río Cinca.

LAS LLANURAS CEREALISTAS Y ESTEPARIAS

En el área sur del Somontano se encuentran importantes ecosistemas esteparios característicos del Valle del Ebro. Constituye la zona más árida de la comarca, un paisaje donde dominan los cultivos de secano salpicados por reductos de vegetación natural.

Se trata de un paisaje humanizado y abierto entre muelas terrosas; en las laderas umbrías se encuentran reducidos pinares de pino carrasco, mientras que en las solanas prospera el matorral bajo, compuesto de romeros, tomillos, lastón, etc. Aquí anida el **búho real**, el ali-

moche, el **águila real**, la **curruca tomillera**, la **cogujada montesina** y la **collalba negra**.

Las llanuras cerealistas son el hábitat del **aguilucho cenizo**, **cernícalo primilla**, **mochuelo común**, y diversas aves esteparias como el **alcaraván**, la **ganga ibérica**, la **ganga ortega** y el **sisón**. La **colриста carraca** anida en árboles del margen de los campos, ya sea en los cultivos leñosos o en el carrascal, donde de forma extraordinaria algunos años anida el **elanio azul**, bella y escasa rapaz más propia del centro y suroeste de la Península.



Carraca.




Muela de Terreu.

Aves singulares

3



Águila real
Aquila chrysaetos



Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus



Águila pescadora
Pandion haliaetus



Águila culebrera
Circaetus gallicus



Aguillilla calzada
Hieraeus pennatus



Buitre leonado
Gyps fulvus



Alimoche
Neophron percnopterus



Águila azor perdicera
Hieraeus fasciatus



Leyenda

- Estival
- Invernante
- En paso
- Residente

- Cortados-medio rupícola
- Masa forestal-cultivos tradicionales
- Estepa cerealista
- Humedales, ríos

Nota: las diferencias de tamaño entre las ilustraciones de unas aves y otras no se corresponden con las diferencias reales.



Milano real
Milvus milvus



Alcotán
Falco subbuteo



Cernícalo vulgar
Falco tinnunculus



Aguilucho pálido
Circus cyaneus



Milano negro
Milvus migrans



Aguilucho lagunero
Circus aeruginosus



Aguilucho cenizo
Circus pygargus



Busardo ratonero
Buteo buteo



Azor
Accipiter gentilis



Gavilán
Accipiter nisus



Abejero europeo
Pernis apivorus



Cernícalo primilla
Falco naumanni



Halcón peregrino
Falco peregrinus





Curruca cabecinegra
Sylvia melanocephala



Reyzeuelo listado
Regulus ignicapillus



Garza real
Ardea cinerea



Cogujada montesina
Galerida theklae




Vencejo real
Apus melba



Alcaraván
Burhinus oedicnemus



Avefría
Vanellus vanellus



Cerceta común
Anas crecca



Roquero rojo
Monticola saxatilis



Somormujo lavanco
Podiceps cristatus



Leyenda

-  Estival
-  Invernante
-  En paso
-  Residente
-  Cortados-medio rupícola
-  Masa forestal-cultivos tradicionales
-  Estepa cerealista
-  Humedales, ríos

Gorrión chillón
Petronia petronia



Carbonero común
Parus major



Oropéndola
Oriolus oriolus



Treparriscos
Tichodroma muraria



Herrerillo común
Parus caeruleus



Escribano montesino
Emberiza cia



Alcaudón común
Lanius senatur




Chova piquirroja
Pyrhocorax pyrrhocorax



Rutas y puntos de observación de aves

4

ALQUÉZAR Y TRAMO ALTO DEL RÍO VERO



Alquézar y el río Vero cuentan con un buen número de rutas señalizadas que nos acercan a la gran diversidad de ambientes y de elementos patrimoniales que caracterizan este entorno. Aunque sólo se describen tres itinerarios, cualquier otro nos permitiría también observar gran número de aves. Por ejemplo, la ruta al Mesón de Sevil, que asciende a unos 1.300 m. de altitud o el recorrido entre Radiquero y la Virgen de Viña, paraje poco frecuentado por turistas que discurre entre roquedos y vegetación mediterránea.

RED NATURA 2000:


- ZEPA de la Sierra y Cañones de Guara
- LIC Sierra y Cañones de Guara
- LIC Guara Norte

AMBIENTES:

- Sierras prepirenaicas
- Río y humedales
- Paisaje agroforestal



Pasarelas en Alquézar.



Treparriscos.

A pie

1. Las pasarelas del Vero o Barranco de la Fuente

Alquézar

Sencillo y atractivo recorrido que desciende por el Barranco de la Fuente hasta el cañón del río Vero por pasarelas y escaleras colgantes, que tuvieron un uso tradicional y ahora están restauradas para facilitar el acceso al público. En invierno se observa con facilidad a los **treparriscos** en cualquier pared rocosa del camino, incluso bajo el castillo-colegiata, así como al **acentor alpino** los días más fríos. En primavera y verano veremos y escucharemos a los ruidosos **vencejos reales y comunes** y al **gorrión chillón**. Además, a primera y última hora del día, cuando el río está tranquilo observaremos al **mirlo acuático**, **martín pescador** y la **lavandera cascadeña**.

Recorrido circular.

Longitud: 2 km.

Desnivel: 150 m.

Duración de la ruta, sin contemplar la actividad de observación de aves: 1 hora 30 minutos.

2. Ruta de Chimiachas

Alquézar - Basacol - Cueva de Chimiachas - Alquézar

Camino que asciende desde Alquézar por los roquedos, entre arbustos y matorral mediterráneo enmarcado por las espectaculares vistas del cañón del Vero. Es obligatoria una parada en la caseta de pastor, bajo el cerro de Quizáns. Aquí se observan el **quebrantahuesos**, **alimoche**, **buitre leonado** y el **águila real** que anidan entre las miles de oquedades y abrigos de la roca. Se trata también de un lugar de observación estratégico durante los pasos migratorios.

Una vez en el barranco de Chimiachas, en la cara norte del cerro de Quizáns, se encuentra el bosque mixto de pinos y quejigos donde encontraremos aves forestales como el **arrendajo**, **herrerillo capuchino**, **reyzuelo listado** y **mito**. Desde la cueva con pinturas rupestres de Chimiachas se domina otro impresionante tramo del barranco muy frecuentado por los quebrantahuesos.

Si el retorno a Alquézar se hace por el barranco de Payuala, en invierno se puede localizar al **treparriscos** y a partir de la primavera al hermoso **roquero rojo**.

Recorrido circular.

Longitud: 12 km.

Desnivel: 700 m.

Duración de la ruta, sin contemplar la actividad de observación de aves: 5 horas.


En coche

Alquézar - Río Vero en el Puente de la Albarda - Campos de Colungo - Puente de las Gargantas - Mirador del Vero - Alquézar

La ruta en coche permite hacer paradas estratégicas en puntos interesantes como el puente de la Albarda, donde se pueden observar en el río al **mirlo acuático** y entre la vegetación, al **escribano soteño** y al **agateador común**. Los campos de Colungo son buen lugar para **fringílidos** y para las **curruacas cabecinegra** y, a partir de la primavera, la **curruca mirloña**. Desde mediados de otoño hasta el comienzo de la primavera, los **treparriscos** frecuentan las paredes de conglomerados de los barrancos de Palomeras y las Gargantas, por lo que merece la pena parar en ambos puentes. Y por último, nos detendremos en el Mirador del Vero, que se ubica frente al barranco de la Choca, uno de los más espectaculares y vírgenes de la sierra. Desde aquí, con el telescopio, será fácil localizar a los **buitres** y otras **rapaces** en sus posaderos. Se puede seguir a pie unos 30 minutos la ruta a los abrigos con pinturas rupestres de Mallata, multiplicando así las posibilidades de observar al **quebrantahuesos** y también, a partir de la primavera, al **alimoche**, **abejero europeo**, **aguililla calzada** y **culebrera europea**.

Longitud: 40 km (ida y vuelta).

BIERGE Y RODELLAR



Estas poblaciones, en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Guara son punto de partida de múltiples rutas que se adentran en los rincones más espectaculares de este espacio natural protegido. Cualquiera de ellas nos permitirá la observación de las aves más singulares del Somontano. Por eso además de las tres descritas a continuación, se recomiendan parajes como las Crestas de Balced o el valle de Las Almunias de Rodellar con la ruta del puente de Pedruel a la ermita de la Trinidad, Cheto y la Virgen del Castillo o la Fuente de la Tamara.

RED NATURA 2000:

- ZEPA Sierra y Cañones de Guara
- LIC Guara Norte
- LIC Sierra y Cañones de Guara

AMBIENTES:

- Transición entre regiones biogeográficas alpina y mediterránea
- Sierras prepirenaicas
- Paisaje agroforestal

- Carretera
- Ruta en coche
- Ruta 1
- Ruta 2
- Otras rutas a pie
- Punto panorámico
- Punto de observación de aves
- Comedero
- Río
- Barranco
- Vértice, altitud
- Escarpe rocoso
- Árbol monumental
- Núcleo de población
- Ermita, santuario



RUTAS SEÑALIZADAS RECOMENDADAS

A pie

1. Real de Mascún

Rodellar – Surgencia de Mascún
- Dolmen de Losa Mora – Nasarre
- Otín – Barranco de Mascún
- Rodellar

Combinación de hábitats de influencia mediterránea y alpina, en un paisaje dominado por roquedos, donde se pueden observar gran variedad de especies entre las que destacan las aves rapaces como **buitre leonado**, **quebrantahuesos**, **águila real** o **alimoche**. En el entorno de la Surgencia de Mascún y durante el invierno, se observa con facilidad al **treparriscos**, **mirlo acuático** y **escribano montesino** e incluso al **verderón serrano** por el fondo del barranco.

Ruta circular.

Longitud: 17 km.

Desnivel: 650 m.

Duración de la ruta, sin contemplar la actividad de observación de aves: 5 horas y 30 minutos.

Rodellar – Surgencia de Mascún: 1,5 Km. con un desnivel de 130 m. Ida y vuelta 1 hora.



Águila real.

2. Ruta del Huevo de Morrano

S2-Red de senderos del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara

Se parte del pueblo de Morrano recorriendo cultivos tradicionales hasta adentrarse en un paraje entre barrancos con pinares de pino carrasco, carrascales y matorral mediterráneo; se encuentran, entre otros, el **arrendajo**, **piquituerto**, **reyzuelo listado** y **escribano soteño**. A partir de primavera se ve el **mosquitero papialbo**, **currucas carrasqueña** y **mirlona**, **abejero europeo**, **culebrera europea** y **aguililla calzada**. Finalmente se pasea por la base de un impresionante risco de conglomerados y areniscas que ofrece excelentes observaciones de **treparriscos** en invierno y de rapaces como el **halcón peregrino** y el **águila real**.

Longitud: 6, 5 km. Ida y vuelta.

Desnivel: 200 m.

Duración de la ruta, sin contemplar la actividad de observación de aves: 2 horas.



Barranco de Mascún.

En coche

La carretera de Bierge a Rodellar



Discurre por una panorámica loma entre los barrancos de Balced y Alcanadre, que favorece la existencia de una serie de miradores naturales a ambos lados de la misma.

Son puntos poco frecuentados por turistas y excelentes para montar el catalejo y observar a las aves **rapaces** en sus posaderos.

Longitud: 37 km. Ida y vuelta.



LOS SOTOS DEL CINCA Y EL BARRANCO DE OLVENA





RED NATURA 2000:

- LIC Ríos Cinca y Alcanadre
- LIC Congosto de Olvena

AMBIENTES:

- Ríos y humedales
- Sierras prepirenaicas

El río Cinca cuenta en este tramo con uno de los bosques de ribera mejor conservados de Aragón. Destaca la presencia del **pájaro moscón**, de todas las **garzas** de la Península e incluso especies de rango marismeno como el **rascón europeo**. En los cortados de la ribera anida el **búho real** y a pocos kilómetros se encuentra el Congosto de Olvena, excelente complemento para este destino, donde domina un entorno de roquedos de gran interés geológico y ornitológico, con presencia del **treparriscos** en otoño e invierno.

RUTAS SEÑALIZADAS RECOMENDADAS

A pie

Ruta de la Vida en el carrizo

El Grado

La ruta parte del Centro de Interpretación de la Vida en el Río Cinca, en el antiguo molino de El Grado.

El camino se adentra progresivamente por entre la vegetación de ribera. Al poco tiempo de caminar se llega hasta un observatorio ubicado en un lugar principal y destacado junto al carrizal.

Desde aquí se pueden observar las **garzas** y demás aves acuáticas, como el **carricero tordal**, el **carricero común** y el **rascón europeo**; las aves del arbolado como el **pico picapinos** y el **pájaro moscón**; y finalmente aves rapaces como el **aguilucho lagunero** y el **milano real** y **milano negro**.

Ruta circular.

Duración: 30 minutos.

Desnivel: inapreciable.


En coche

Sierras y ríos

El Grado- Olvena

Se recomienda hacer paradas estratégicas en los apartaderos de la carretera A-139 que miran al río Cinca. Después, una vez tomado el desvío a Olvena (carretera A-138), parar antes de los túneles de roca y acercarse al puente de piedra para descubrir aves como el **gorrión chillón**, **roquero solitario** y el **colirrojo tizón**. Además en invierno se puede observar al **treparriscos** y a partir de primavera a la **golondrina daúrica**. Una vez en el pueblo, cerca del cementerio existe un mirador espectacular de los roquedos del congosto. Con el catalejo localizaremos posaderos de aves rapaces y con suerte admiraremos el vuelo de **quebrantahuesos**, **buitre leonado**, **águila real**, la escasa **águila perdicera** y, a partir de primavera, el **alimoche** y la **culebrera europea**.

Longitud: 40 km. en coche. Ida y vuelta.



El Búho real.



Puente del Diablo en Olvena.

LLANURAS ESTEPARIAS CEREALISTAS



- Carretera
- Ruta en coche
- Ruta a pie
- Punto panorámico
- Punto de observación de aves
- Río
- Barranco
- ▲ Vértice, altitud
- Escarpa rocosa
- Árbol monumental
- Núcleo de población
- ✠ Ermita, santuario



El ambiente de las áridas llanuras premonagrinas es una zona de gran importancia ornitológica por la presencia de aves esteparias y también por el contraste y el grado de conservación de la vegetación de ribera del río Alcanadre, que supone un oasis entre las llanuras cultivadas.

RED NATURA 2000:

- LIC Río Alcanadre

AMBIENTES:

- Estepas cerealistas
- Ríos y humedales



Sisón.

RUTAS SEÑALIZADAS RECOMENDADAS

A pie

Ruta David Gómez

Torres de Alcanadre

El camino que parte desde la ermita de San Bartolomé, cuenta con paneles interpretativos sobre el paisaje y sus elementos. Transcurre tanto por la estepa como por los estrechos bosques de la ribera del Alcanadre, pasando por las escarpadas laderas de areniscas. Al llegar al río hay un observatorio donde se ven aves acuáticas como **ánade real**, **garza real** y **focha común** y entre otras aves más pequeñas la **oropéndola**, el **ruiseñor bastardo**, el **carricero común** y el **martín pescador**.

Características:

Se pueden hacer tres rutas distintas con las siguientes longitudes y direcciones calculadas desde la Plaza Mayor del pueblo y considerando el recorrido de ida y el de vuelta:

- a) 2,8 km y 1 h de duración,
- b) 4 km y 1 hora 30 minutos,
- c) 4,5 km y 2 horas.

En coche

Ruta por Tierras del Sur

Ponzano - Laperdiguera - Berbegal
- Pista del Canal de Terreu
- El Tormillo - Peralta de Alcofea
- Berbegal - Ponzano

El itinerario en coche recorre las carreteras y pistas rurales que atraviesan las llanuras cerealistas. Dada la fragilidad y características esquivas de las aves esteparias, no existen puntos de interés ornitológico señalizados, por lo que hay que adentrarse por alguna pista agrícola y elegir lugares amplios o puntos elevados de la carretera donde parar. Podremos localizar a las aves esteparias como la **ganga ortega** y la escasa **ganga ibérica** y demás aves asociadas a este paisaje como **sisón común**, **alcara-ván**, **carraca europea**, **cogujada montesina**, **mochuelo europeo**, **aguilucho cenizo** y **cernícalo primilla**. Atención a las muelas y sasos donde anidan aves como el **alimoche** y la **collalba negra** y en la vegetación al pie de las mismas la **curruca tomillera**.

Características: 50 km (incluido el tramo de pista entre Berbegal, Terreu y El Tormillo). Ida y vuelta.



El Somontano desde el Sur.

Biodiversidad

5

Son varios los factores que han dado lugar a la extraordinaria variedad de ambientes que reúne el Somontano: la situación de transición, entre la montaña y el llano; la variedad de sustratos, de gradientes altitudinales y orientaciones; la orientación Norte-Sur de sus ríos, el carácter inaccesible de sus sierras y profundos cañones; y la actividad humana a lo largo de su historia.

La biodiversidad es por ello una característica notable del medio natural de este territorio. La fauna y flora presentan una riqueza extraordinaria.

La nutria: Puede ser observada, incluso de día, en zonas de los ríos fuera de las rutas turísticas.

Además de los mamíferos habituales del bosque mediterráneo, se encuentran aquí la mayoría de las especies de murciélagos de la Península (24) como *Rhinolophus ferrumequinum*, *Plecotus auritus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus euryale*, *Myotis capaccinii*, etc.



Nutria.

Las mariposas: Existe una notable variedad con presencia de al menos 139 especies de mariposas diurnas entre las cuales se destacan: *Zerinthia rumina*, *Zegris eupheme*, *Hipparchia fagi*, *Polyommatus ainsae*, *Eurodryas aurinia* y *Melanargia ines*, *Carcharodus boeticus*, *Pandoriana pandora*, *Erebia triaria*, *Parnassius apollo*, *Laeosopis roboris*, *Charaxes jasius*. Entre las especies de vuelo nocturno destaca *Graellsia isabelae* en los pinares de pino silvestre, y la cada vez más escasa *Saturnia pyri*.



Parnassius apollo en los altos de Sevil.

Orquideas: Se pueden encontrar hasta 30 especies distintas, entre ellas: *Epipactis palustris*, *Ophrys sphegodes*, *Ophrys insectifera*, *Platanthera bifolia*, *Limodorum abortivum*, *Ophrys fusca* y también la *Orchis purpurea* que es una de las más escasas y suele darse en lugares húmedos de terrenos calcáreos en la región mediterránea.



Orchis purpurea.

Las libélulas y caballitos del diablo. Algunas de las especies presentes en nuestros enclaves húmedos son: *Anax imperator*, *Libellula depressa*, *Cordulegaster anulatus*, *Orthetrum cancellatum* *sympetrum fonscolombei*, entre las libélulas, y *Calopteryx splendens*, *Coenagrion puella*, *Lestes sponsa*, *Pyrrhosoma nymphula*, entre los caballitos.



Calopteryx splendens xhantostoma.

Flora rupícola: *Petrocoptis guarensis*, es de una flor endémica del Parque Natural de Guara, de área de distribución reducida. Es fácil encontrarla en flor en los cantiles rocosos del río Vero, sólo durante la primavera. Otras especies presentes en el Somontano son *Valeriana longiflora* *ssp. pau*, *Saxifraga longifolia*, *Globularia repens* y *Ramonda myconi*.



Petrocoptis guarensis.

Otros atractivos turísticos

6

BARBASTRO

Junto a las estrechas calles que dan vida al barrio del Entremuro se alza la Catedral de la Asunción, obra insigne de Barbastro, que consigue asombrar al visitante por sus dimensiones y su ligereza interior. No se recupera el espectador cuando descubre el magnífico retablo mayor, obra del escultor del renacimiento Damián Forment.

Imponente es también el Palacio de los Hermanos Argensola, casa solariega de exquisito trabajo en el alero. Casa Latorre, hoy sede de la UNED, comparte con él las características de la arquitectura aragonesa en el renacimiento.

Barbastro, capital del Somontano, ofrece sus servicios al resto de la comarca y a todo aquel que se acerque a descubrirla. Su privilegiada situación, entre el área mediterránea y el norte cantábrico, permite a Barbastro ser un punto estratégico de conexión territorial entre este eje y el Pirineo Central.

Ciudad comercial, con su centro neurálgico en su Plaza del Mercado, y ciudad de ferias, compagina una rica tradición con la actualidad de una ciudad de congresos moderna, contando con inmejorables instalaciones junto a un entorno natural inigualable.



Catedral de Barbastro.

EL ARTE RUPESTRE DEL RÍO VERO

Los más de sesenta abrigos con arte rupestre identificados en el Somontano, evidencian que el hombre prehistórico habitó en este territorio durante un largo periodo de tiempo. Fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1998 y han sido certificados por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural Europeo. Se conservan pinturas de todos los estilos clásicos conocidos en la Península Ibérica: Paleolítico, Levantino y Esquemático.

La importancia de este

legado histórico fue uno de los principales motivos para que se creara el "Parque Cultural del Río Vero", aplicando una figura legal creada por el gobierno autonómico de Aragón, para reconocer y proteger espacios que cuentan con un patrimonio cultural relevante integrado en un medio natural de diversidad y riqueza excepcionales.

Existe un servicio organizado de visitas guiadas a los abrigos de Arpán, Mallata y Barfaluy, que parte del Centro de Arte Rupestre ubicado en Colungo.



Ciervo de Chimiachas.

ALQUÉZAR Y LA COLEGIATA DE SANTA MARÍA

Declarado como conjunto histórico, este pueblo de origen medieval que ha conservado un trazado urbano de sinuosas y encantadoras callejuelas, así como numerosas muestras de arquitectura tradicional, seduce a todo viajero que lo visita.

Esta situado en la Sierra de Guara, al borde del tramo medio del

cañón del río Vero, en un enclave de paisaje espectacular.

En la parte alta de la población, sobre una peña, se alza el castillo colegiata de Santa María la Mayor, que cuenta con una majestuosa iglesia del siglo XVI y un claustro en el que se pueden contemplar capiteles románicos historiados y pinturas murales.



Castillo - colegiata de Alquézar.

DEPORTE Y NATURALEZA EN GUARA

La Sierra de Guara alberga una densa red de gargantas y cañones de espectacular belleza, donde todos los años numerosos turistas experimentan sensaciones extraordinarias realizando descenso de barrancos.

La zona ofrece también buenas condiciones para practicar otras actividades deportivas

y de disfrute de la naturaleza como la escalada, los recorridos en bicicleta de montaña o caminando por la extensa red de senderos señalizados existente.

Más de veinte empresas de turismo activo ofrecen servicios profesionales de guías y alquiler de material deportivo.



Descenso de barrancos.

VINO Y GASTRONOMÍA

Más de 30 bodegas desarrollan su actividad en este territorio amparadas por la Denominación de Origen "Somontano". Muchas de ellas acogen visitas y ofrecen actividades relacionadas con el mundo del vino (visitas al viñedo, cursos de cata, etc). Todos los servicios de "enoturismo" están organizados bajo el producto "Ruta del Vino del Somontano".

Otros productos agroalimentarios de gran calidad y personalidad son: el aceite de oliva, quesos de cabra y oveja, miel, licores, jamón curado, embutidos como la longaniza, otros productos cárnicos, mermeladas, dulces tradicionales, frutos secos garrapiñados. En la localidad de Buera, "el Torno", el antiguo molino de aceite, se ha rehabilitado y acondicionado como centro de interpretación del olivo y el aceite.



Bodega del Somontano.

Aves presentes en el Somontano de Barbastro



☐ ZAMPULLIN COMUN	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	☐ CERNICALO PATIRROJO	<i>Falco vespertinus</i>
☐ SOMORMUJO LAVANCO	<i>Podiceps cristatus</i>	☐ ESMEREJON	<i>Falco columbarius</i>
☐ ZAMPULLIN CUELLINEGRO	<i>Podiceps nigricollis</i>	☐ ALCOTAN	<i>Falco subbuteo</i>
☐ CORMORAN GRANDE	<i>Phalacrocorax carbo</i>	☐ HALCON PEREGRINO	<i>Falco peregrinus</i>
☐ AVETORO COMUN	<i>Botaurus stellaris</i>	☐ HALCÓN DE ELEONORA	<i>Falco eleonora</i>
☐ AVETORILLO COMUN	<i>Ixobrychus minutus</i>	☐ ELANIO AZUL	<i>Elanus Caeruleus</i>
☐ MARTINETE COMUN	<i>Nycticorax nycticorax</i>	☐ PERDIZ ROJA	<i>Alectoris rufa</i>
☐ GARCILLA CANGREJERA	<i>Ardeola Ralloides</i>	☐ CODORNIZ COMUN	<i>Coturnix coturnix</i>
☐ GARCILLA BUEYERA	<i>Bubulcus ibis</i>	☐ RASCON	<i>Rallus aquaticus</i>
☐ GARCETA GRANDE	<i>Egretta alba</i>	☐ GALLINETA COMÚN	<i>Gallinula chloropus</i>
☐ GARCETA COMUN	<i>Egretta garcetta</i>	☐ FOCHA COMUN	<i>Fulica atra</i>
☐ GARZA REAL	<i>Ardea cinerea</i>	☐ GRULLA COMUN	<i>Grus grus</i>
☐ GARZA IMPERIAL	<i>Ardea purpurea</i>	☐ SISON	<i>Tetrax tetrax</i>
☐ CIGÜEÑA BLANCA	<i>Ciconia ciconia</i>	☐ AVUTARDA	<i>Otis tarda</i>
☐ CIGÜEÑA NEGRA	<i>Ciconia nigra</i>	☐ CIGÜEÑUELA	<i>Himantopus himantopus</i>
☐ SILBON EUROPEO	<i>Anas penelope</i>	☐ ALCARAVAN	<i>Burhinus oedienemus</i>
☐ ANADE FRISO	<i>Anas strepera</i>	☐ CHORLITEJO CHICO	<i>Charadrius dubius</i>
☐ CERCETA COMUN	<i>Anas crecca</i>	☐ AVEFRIA	<i>Vanellus vanellus</i>
☐ ANADE AZULON	<i>Anas platyrhynchos</i>	☐ CORRELIMOS COMUN	<i>Calidris alpina</i>
☐ ANADE RABUDO	<i>Anas acuta</i>	☐ ANDARRIOS GRANDE	<i>Tringa ochropus</i>
☐ CERCETA CARRETONA	<i>Anas querquedula</i>	☐ GAVIOTA REIDORA	<i>Larus ridibundus</i>
☐ PATO CUCHARA	<i>Anas clypeata</i>	☐ GAVIOTA PATIAMARILLA	<i>Larus cachinnans</i>
☐ PATO COLORADO	<i>Netta rufina</i>	☐ GANGA ORTEGA	<i>Pterocles orientalis</i>
☐ PORRON COMUN	<i>Aythya ferina</i>	☐ GANGA IBÉRICA	<i>Pterocles alchata</i>
☐ PORRON MOÑUDO	<i>Aythya fuligula</i>	☐ PALOMA BRAVÍA	<i>Columba livia</i>
☐ ABEJERO EUROPEO	<i>Pernis apivorus</i>	☐ PALOMA ZURITA	<i>Columba oenas</i>
☐ MILANO NEGRO	<i>Milvus migrans</i>	☐ PALOMA TORCAZ	<i>Columba palumbus</i>
☐ MILANO REAL	<i>Milvus milvus</i>	☐ TORTOLA TURCA	<i>Streptopelia decaocto</i>
☐ QUEBRANTAHUESOS	<i>Gypaetus barbatus</i>	☐ TORTOLA COMUN	<i>Streptopelia turtur</i>
☐ ALIMOCHE	<i>Neophron percnopterus</i>	☐ CRIALO	<i>Clamator glandarius</i>
☐ BUITRE LEONADO	<i>Gyps fulvus</i>	☐ CUCO	<i>Cuculus canorus</i>
☐ ÁGUILA CULEBREA	<i>Circus gallicus</i>	☐ LECHUZA COMUN	<i>Tyto alba</i>
☐ AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL	<i>Circus aeruginosus</i>	☐ AUTILLO	<i>Otus scops</i>
☐ AGUILUCHO PALIDO	<i>Circus cyaneus</i>	☐ BUHO REAL	<i>Bubo bubo</i>
☐ AGUILUCHO CENIZO	<i>Circus pygargus</i>	☐ MOCHUELO EUROPEO	<i>Athene noctua</i>
☐ AZOR	<i>Accipiter gentilis</i>	☐ CARABO COMUN	<i>Strix aluco</i>
☐ GAVILAN	<i>Accipiter nisus</i>	☐ BUHO CHICO	<i>Asio otus</i>
☐ BUSARDO RATONERO	<i>Buteo buteo</i>	☐ CHOTACABRAS GRIS	<i>Caprimulgus europaeus</i>
☐ ÁGUILA REAL	<i>Aquila chrysaetos</i>	☐ CHOTACABRAS PARDO	<i>Caprimulgus ruficollis</i>
☐ AGUILILLA CALZADA	<i>Hieraetus pennatus</i>	☐ VENCEJO COMUN	<i>Apus apus</i>
☐ ÁGUILA PERDICERA	<i>Hieraetus fasciatus</i>	☐ VENCEJO REAL	<i>Apus melba</i>
☐ ÁGUILA PESCADORA	<i>Pandion haliaetus</i>	☐ MARTIN PESCADOR	<i>Alcedo atthis</i>
☐ CERNICALO PRIMILLA	<i>Falco naumanni</i>	☐ ABEJARUCO COMUN	<i>Merops apiaster</i>
☐ CERNICALO COMÚN	<i>Falco tinnunculus</i>	☐ CARRACA	<i>Coracias garrulus</i>
		☐ ABUBILLA	<i>Upupa epops</i>

☐	TORCECUELLO	<i>Jynx torquill</i>
☐	PITO REAL	<i>Picus viridis</i>
☐	PITO NEGRO	<i>Dryocopus martius</i>
☐	PICO PICAPINOS	<i>Dendrocopos major</i>
☐	CALANDRIA	<i>Melanocorypha calandra</i>
☐	TERRERA COMUN	<i>Calandrella brachidactyla</i>
☐	TERRERA MARISMEÑA	<i>Calandrella rufescens</i>
☐	COGUJADA COMUN	<i>Galerida cristata</i>
☐	COGUJADA MONTESINA	<i>Galerida theklae</i>
☐	TOTOVIA	<i>Lullula arborea</i>
☐	ALONDRA COMUNA	<i>Lauda arvensis</i>
☐	AVIÓN ZAPADOR	<i>Riparia riparia</i>
☐	AVIÓN ROQUERO	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
☐	GOLONDRINA COMUN	<i>Hirundo rustica</i>
☐	GOLONDRINA DAURICA	<i>Hirundo daurica</i>
☐	AVIÓN COMÚN	<i>Delichon urbica</i>
☐	BISBITA CAMPESTRE	<i>Anthus campestris</i>
☐	BISBITA COMUN	<i>Anthus pratensis</i>
☐	BISBITA RIBEREÑO ALPINO	<i>Anthus spinoletta</i>
☐	LAVANDERA BOYERA	<i>Motacilla flava</i>
☐	LAVANDERA CASCADEÑA	<i>Motacilla cinerea</i>
☐	LAVANDERA BLANCA	<i>Motacilla alba</i>
☐	MIRLO ACUATICO	<i>Cinclus cinclus</i>
☐	CHOCHIN	<i>Troglodytes troglodytes</i>
☐	ACENTOR COMUN	<i>Prunella modularis</i>
☐	ACENTOR ALPINO	<i>Prunella collaris</i>
☐	PETIRROJO	<i>Erithacus rubecula</i>
☐	RUISEÑOR COMUN	<i>Luscinia megarhynchos</i>
☐	COLIRROJO TIZON	<i>Phoenicurus ochrurus</i>
☐	COLIRROJO REAL	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
☐	TARABILLA COMUN	<i>Saxicola torquata</i>
☐	COLLALBA GRIS	<i>Oenanthe oenanthe</i>
☐	COLLALBA RUBIA	<i>Oenanthe hispanica</i>
☐	COLLALBA NEGRA	<i>Oenanthe leucura</i>
☐	ROQUERO ROJO	<i>Monticola saxatilis</i>
☐	ROQUERO SOLITARIO	<i>Monticola solitarius</i>
☐	MIRLO CAPIBLANCO	<i>Turdus torquatus</i>
☐	MIRLO COMUN	<i>Turdus merula</i>
☐	ZORZAL REAL	<i>Turdus pilaris</i>
☐	ZORZAL COMUN	<i>Turdus philomelos</i>
☐	ZORZAL ALIRROJO	<i>Turdus iliacus</i>
☐	ZORZAL CHARLO	<i>Turdus viscivorus</i>
☐	RUISEÑOR BASTARDO	<i>Cettia cettia</i>
☐	BUITRON	<i>Cisticola jundicis</i>
☐	CARRICERO COMUN	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
☐	CARRICERO TORDAL	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
☐	ZARCERO COMUN	<i>Hippolais polyglotta</i>
☐	CURRUCA RABILARGA	<i>Sylvia undata</i>

☐	CURRUCA TOMILLERA	<i>Sylvia conspicillata</i>
☐	CURRUCA CASRRASQUEÑA	<i>Sylvia cantillans</i>
☐	CURRUCA CABECINEGRA	<i>Sylvia melanocephala</i>
☐	CURRUCA MIRLONA	<i>Sylvia hortensis</i>
☐	CURRUCA MOSQUITERA	<i>Sylvia borin</i>
☐	CURRUCA CAPIROTADA	<i>Sylvia atricapilla</i>
☐	MOSQUITERO PAPIALBO	<i>Phylloscopus bonelli</i>
☐	MOSQUITERO COMUN	<i>Phylloscopus collybita</i>
☐	REYEZUELO SENCILLO	<i>Regulus regulus</i>
☐	REYEZUELO LISTADO	<i>Regulus ignicapillus</i>
☐	PAPAMOSCAS GRIS	<i>Muscicapa striata</i>
☐	PAPAMOSCAS CERROJILLO	<i>Ficedula hipoleuca</i>
☐	MITO	<i>Aegithalos caudatus</i>
☐	HERRERILLO CAPUCHINO	<i>Panurus cristatus</i>
☐	CARBONERO GARRAPINOS	<i>Parus ater</i>
☐	HERRERILLO COMUN	<i>Parus caeruleus</i>
☐	CARBONERO COMUN	<i>Parus major</i>
☐	TREPADOR AZUL	<i>Sitta europaea</i>
☐	TREPARRISCOS	<i>Tichodroma muraria</i>
☐	AGATEADOR COMUN	<i>Certhia brachydactyla</i>
☐	PAJARO MOSCON	<i>Remiz pendulinus</i>
☐	OROPENDOLA	<i>Oriolus oriolus</i>
☐	ALCAUDON DORSIRROJO	<i>Lanius collurio</i>
☐	ALCAUDON REAL	<i>Lanius meridionalis</i>
☐	ALCAUDON COMUN	<i>Lanius senator</i>
☐	ARRRENDADO	<i>Garrulus glandarius</i>
☐	URRACA	<i>Pica pica</i>
☐	CHOVA PIQUIRROJA	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
☐	CUERVO	<i>Corvus corax</i>
☐	ESTORNINO PINTO	<i>Sturnus vulgaris</i>
☐	ESTORNINO NEGRO	<i>Sturnus unicolor</i>
☐	GORRION COMUN	<i>Passer domesticus</i>
☐	GORRION MOLINERO	<i>Passer montanus</i>
☐	GORRION CHILLON	<i>Petronia petronia</i>
☐	PINZON VULGAR	<i>Fringilla coelebs</i>
☐	PINZON REAL	<i>Fringilla montifringilla</i>
☐	VERDECILLO	<i>Serinus serinus</i>
☐	VERDERON SERRANO	<i>Serinus citrinella</i>
☐	VERDERON COMUN	<i>Carduelis chloris</i>
☐	JILGUERO	<i>Carduelis carduelis</i>
☐	LUGANO	<i>Carduelis spinus</i>
☐	PARDILLO COMUN	<i>Carduelis cannabina</i>
☐	PIQUITUERTO	<i>Loxia curvirostra</i>
☐	ESCRIBANO SOTEÑO	<i>Emberiza cirrus</i>
☐	ESCRIBANO MONTESINO	<i>Emberiza cia</i>
☐	ESCRIBANO HORTELANO	<i>Emberiza hortulana</i>
☐	TRIGUERO	<i>Miliaria calandra</i>
☐	PICOGORDO	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>

Red de comederos para aves carroñeras

8


Los comederos para aves necrófagas tienen como objetivo la conservación de las aves carroñeras con las debidas garantías de sanidad animal y ofrecen a los amantes de la naturaleza excelentes oportunidades de observar de cerca a las aves rapaces. En la comarca de Somontano de Barbastro existen cuatro, ubicados en Bierge, Alquézar, Estadilla y Naval.

Los comederos de Alquézar y Bierge cuentan con sendos observatorios. Si al llegar a éstos tenemos la suerte de que ese día se ha aportado comida, asistiremos a una escena inolvidable: pueden llegar al festín cientos de **buitres**, así como **alimoches**, **águilas reales**, **milanos**, etc.

En el caso de que estos comederos no hayan sido provistos de comida recientemente, siguen ofreciendo buenas condiciones de alimento para invertebrados y pequeños mamíferos que son presa de otras muchas aves como

golondrinas, **vencejos**, **zorzales**, **escribanos**, **fringílidos**, **curruacas**, **córvidos** y por supuesto para las **rapaces cazadoras**. Incluso podemos encontrar la visita sorpresa de un **quebrantahuesos**, ya que suele frecuentar los comederos para llevarse las carcasas que dejan limpias las demás especies carroñeras.

Está expresamente prohibido entrar dentro de los comederos, por razones sanitarias y para evitar graves molestias a las aves.



Buitres y alimoches.

Bierge

Ruta señalizada recomendada:
Bierge – San Pedro de Verona
– Observatorio de aves

Longitud: 2,7 km

Punto de partida: Plaza de Bierge.

Dificultad: Baja (desnivel inapreciable).

Duración: 1 hora.

El camino al observatorio está señalizado en el cruce, unos metros antes de llegar a la ermita.

Estadilla

Ruta señalizada recomendada:
Estadilla – Ermita de la Carrodilla

Longitud: hasta el comedero 3,8 km; hasta la ermita 12,5 km (Ida y vuelta).

Punto de partida: Portal del Sol, Estadilla.

Dificultad: Baja (desnivel hasta el comedero 170 m; hasta la ermita 370 m).

Duración: hasta el comedero 1 h. y 30 min.; hasta la ermita 5 horas.

El comedero no dispone de observatorio pero su entorno y el recorrido ofrecen excelentes oportunidades para la observación de las aves rapaces.

Alquézar

Ruta señalizada recomendada:
GR 1.1: Tramo de Alquézar – Ermita de San Gregorio – Observatorio de aves

Longitud: 2 km (Ida y vuelta)

Punto de partida: Plaza Nueva en Alquézar

Dificultad: Baja, 100 m. de desnivel

Duración: 1 hora

El comedero de Alquézar se ubica en una zona de fácil acceso y de vistas espectaculares. Es uno de los más frecuentados por las aves rapaces.



Código ético del observador de aves

Las aves son seres vivos y sensibles a las diversas actividades que el ser humano lleva a cabo, incluida su observación, por lo que garantizar su bienestar resulta de vital importancia.

- El bienestar de las aves y su medio natural es prioritario: ninguna molestia a un ave está justificada.
- La época reproductora es muy sensible. Un comportamiento inadecuado puede provocar el abandono de nidos y pollos, o la pérdida de algunos de ellos.
- Las aves que descansan de duros viajes migratorios son también muy sensibles a cualquier molestia. Evita provocar que levanten vuelo.
- Permanece en los caminos, pistas o carreteras siempre que sea posible para minimizar daños o molestias en cualquier hábitat.
- Trata de no ser ruidoso para evitar molestias a las aves y a otros paseantes. Además, así las probabilidades de verlas aumentarán.
- El uso de reclamos y otros medios de atracción están prohibidos, pues ocasionan molestias y estrés en las aves, sobre todo durante la época de cría.
- Infórmate de la normativa vigente en cada lugar antes de visitarlo y respétala. Sigue las indicaciones del personal de vigilancia.
- Informa a las autoridades de cualquier agresión a las aves y su medio que encuentres.
- No entres en las propiedades privadas sin permiso.
- Se amable y respetuoso con los habitantes de medio rural. Ellos cuidan de nuestras aves.
- Revelar la ubicación de nidos puede tener graves consecuencias, sobre todo si es de alguna especie escasa o amenazada.
- Divulga este código ético mediante la palabra y el ejemplo.